

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION Lite H

TA DOKUMENT IMEJTE VEDNO PRI ROKI IN GA PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE. ČE JE PRIŠLO ALI BI LAHKO PRIŠLO DO RESNEGA ZAPLETA, POVEZANEGA S PRIPOMOČKOM, O TEM OBVESTITE NEPOSREDNO IZDELOVALCA ALI POOBlaščenega zastopnika in lokalni regulativni organ.

PREDVIDENI NAMEN

Raztopina HEMOLYSIS WASHING SOLUTION Lite H je raztopina za izpiranje za uporabo z analizatorji HA-8380V, ki so namenjeni za kvantitativne analize HbA1c. Samo za *in vitro* diagnostično uporabo in za strokovno uporabo.

POVZETEK IN NAČELO

Analiza stabilnega HbA1c je zelo uporabna pri diagnosticiranju in zdravljenju sladkorne bolezni in spremljanju stanja sladkorne bolezni. Analizator HA-8380V meri HbA1c v krvi z uporabo reverzno fazne kationsko-izmenjevalne kromatografije. Krvni vzorec, razredčen z raztopino za izpiranje za hemolizo, se vbrizga v kolono, ki vzorec na osnovi visokozmogljive tekočinske kromatografije (HPLC – high performance liquid chromatography) frakcionira na več komponent hemoglobina.

OPOZORILA

- Ta izdelek vsebuje manj kot 0,02% konzervansa natrijevega azida (NaN₃), ki draži sluznico.
- Natrijev azid lahko reagira z bakrom ali svincom, pri čemer lahko nastane eksplozivni kovinski azid.
- Natrijev azid lahko reagira tudi s kislino, pri čemer nastane strupen eksplozivni vodikov azid.
- Zato pri odstranjevanju teh snovi poskrbite za splakovanje z zadostno količino vode, da preprečite morebitne ostanke reagenta v vodovodni cevi.
- Če ta izdelek pride v stik z očmi ali usti, nemudoma izperite z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom.
- Če pride v stik s kožo, sperite z veliko vode.
- Tekoče odpadke, ki vsebujejo vzorce krvi, zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi za biološko nevarne odpadke.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Samo za *in vitro* diagnostično uporabo.
- Ta izdelek je predviden samo za analizatorje HA-8380V. NE poskušajte ga uporabljati z drugimi instrumenti. Glejte uporabniški priročnik instrumenta.
- Če ta izdelek shranjujete na hladnem mestu, na primer v hladilniku, ga pred uporabo v instrumentu najmanj eno uro segrevajte na temperaturo okolice, v kateri je instrument.
- Plastenke z raztopino za izpiranje za hemolizo NE uporabljajte po izteku roka uporabnosti.
- Rok uporabnosti je napisan tako na škatli kot na oznaki plastenke.
- Plastenko z raztopino za izpiranje za hemolizo postavite v določen položaj na pladnju za plastenke in pravilno pritrdite zaporko plastenke s šobo za raztopino za izpiranje za hemolizo.
- Plastenko z raztopino za izpiranje za hemolizo zamenjajte z novo, tudi če ostane majhna količina raztopine.
- Dodajanje nove raztopine v staro plastenko lahko povzroči netočne rezultate analiz.
- S tem izdelkom vedno ravnavajte previdno.
- Izogibajte se fizičnemu šoku.

POSTOPEK ANALIZE

Glejte uporabniški priročnik instrumenta.

SHRANJEVANJE

- Neodprte plastenke z raztopino za izpiranje za hemolizo shranjujte pri temperaturi med 3°C in 30°C in se izogibajte neposredni sončni svetlobi.
- Po odprtju plastenke raztopino za izpiranje za hemolizo porabite v enem mesecu, čeprav še ni potekel rok uporabnosti.
- Če instrumenta ne boste uporabljali en teden ali dlje, odstranite plastenko z raztopino za izpiranje za hemolizo iz instrumenta. Nato tesno privijte zaporko in plastenko shranite pri temperaturi med 3°C in 30°C, da preprečite razgradnjo in/ali koncentracijo tekočine.

PRILOŽENI MATERIAL

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION Lite H: 3 plastenke × 2 L/škatlo, fosfatni pufer, ki vsebuje površinsko aktivno snov.

Snovi, iz katerih so izdelane plastenke:

Plastenka iz polietilena (PE) z zaporko iz polipropilena (PP).

POTREBEN MATERIAL, KI NI PRILOŽEN

Glejte uporabniški priročnik instrumenta.

ODVZEM VZORCEV

Glejte uporabniški priročnik instrumenta.

NADZOR KAKOVOSTI

Glejte uporabniški priročnik instrumenta.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Obrnite se na tehnično pomoč
(TEL: +31-20-545-24-50)

