

Centrifuge Cup (for D-Concept)

Πριν από τη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο λειτουργίας του συγκεκριμένου οργάνου. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσατε ή θα μπορούσατε να έχετε αντιμετωπίσει κάποιο συμβάν σχετιζόμενο με τη συσκευή, αναφέρετε το περιστατικό απευθείας στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και την τοπική κανονιστική αρχή.

Προβλεπόμενη χρήση

- Το Centrifuge Cup (for D-Concept) είναι ένας ειδικός υποδοχέας δείγματος ολικού αίματος για χρήση στη μονάδα SPOTCHEM D-Concept (SD-4820) και SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), η οποία προορίζεται για την ποσοτική μέτρηση διαφόρων φυσιολογικών δείκτων. Μόνο για *in vitro* διαγνωστική χρήση και για επαγγελματική χρήση.

Προειδοποίησης και προφυλάξεις


- Μόνο για *in vitro* διαγνωστική χρήση.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε κλινικά δείγματα και εργαλεία ανάλυσης. Να απορρίπτετε καταλλήλως τα επικινδύνα βιολογικά απόβλητα. Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του συγκεκριμένου οργάνου.
- Να μην επαναχρησιμοποιείται.

Περιγραφή προϊόντος

Αυτός ο σωλήνας δείγματος περιέχει ηπαρίνη ως αντιπηκτικό και χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό του πλάσματος από το ολικό αίμα.

Οδηγίες

1. Ρίζετε 495 μL- 565 μL από το προσφάτως συλλεχθέν ολικό αίμα στον σωλήνα δείγματος.
2. Τοποθετήστε καλά το καπάκι και αναποδογυρίστε απαλά 5 έως 6 φορές για να αναμειχθεί.
3. Αφαιρίστε το καπάκι και αμέως τοποθετήστε τον σωλήνα δείγματος στην εσωτερική φυγόκεντρο του οργάνου για μέτρηση.



Προσοχή

1. Πριν χειρίστε τα δείγματα, να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια μίας χρήσης.
2. Ανοίστε προσεκτικά το καπάκι, φροντίζοντας να μην διασκορπιστούν οι κρύσταλλοι που καλύπτουν την εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα δείγματος. Αυτοί οι κρύσταλλοι είναι η ηπαρίνη λιθίου η οποία χρησιμοποιείται ως αντιπηκτικό.
3. Μην χρησιμοποιείται σωλήνας δείγματος χωρίς καπάκι. Μην χρησιμοποιείται τον σωλήνα δείγματος εάν το καπάκι ή το καπάκι για τη φυγόκεντρηση έχουν υποστεί ζημιά.
4. Να φυλάσσεται σε σκοτεινό μέρος χωρίς υγρασία και μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
5. Ο σωλήνας δείγματος δεν είναι αποστειρωμένος.
6. Ο σωλήνας δείγματος δεν προορίζεται για την αποθήκευση των δείγματων.
7. Μην χρησιμοποιείται τον συγκεκριμένο σωλήνα δείγματος για τη μέτρηση του συλλεχθέντος σε σωλήνες δείγματος με αντιπηκτικό ολικού αίματος.

Αποθήκευση και σταθερότητα

Αποθήκευση σε 2 - 30°C (36 - 86°F)

Οι σωλήνες δείγματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Παρεχόμενο υλικό

Παρέχεται το παρακάτω υλικό στις εξής ποσότητες:

- Centrifuge Cup (for D-Concept): 100 τεμ.
100 καπάκια για τη φυγοκέντρηση
100 καπάκια

Μη παρεχόμενο απαραίτητο υλικό

Για τη μέτρηση απαιτούνται κι άλλα αναλώσιμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του συγκεκριμένου οργάνου.

